

Novimix® Plus C

• Yüksek Verimli Süt İnekleri Yüksek Oranda Enerji ve Proteine İhtiyaç Duyarlar

Yüksek verimli süt ineklerinde, en önemli amino asitler metiyonin ve lizindir.

İneğin yüksek enerji ihtiyacı ve bunun yetersizliği negatif enerji dengesine yol açar (NEB). Lipid mobilizasyonu adipoz dokudan itibaren başlar ve bunun sonucu olarak kanda esterleşmemiş yağ asidi (NEFA) konsantrasyonu 5-10 katı artar. Karaciğer tarafından NEFA alımını etkileyen en önemli iki faktör, NEFA konsantrasyonu ve karaciğere kan akımıdır. Karaciğer yağlı asit yükünün artışı ile başa çıkamaz.

Adipoz dokudan serbest yağ asitleri mobilize olup, lipoproteine dönüştüğü zaman bir metil verici istenir. Niacine (Vitamin PP) karaciğerde esterleşmemiş yağ asitlerinin (NEFA) metabolizasyonunu artırır.

Novimix® Plus C rumen korumalı aminoasitler; **Lizin, Metiyonin, Betain** ve **Niasin** karışımıdır.

Novimix® Plus C Faydaları:

- Karaciğer fonksiyonlarını iyileştirir,
- Yağlı karaciğer oranını azaltır,
- Süt verimi ve süt proteini düzeyini artırır,
- Klinik ketosis ve mastitis oluşumunu azaltır,
- Kuru madde alımını artırır, gelişmeyi olumlu yönde etkiler,
- Metabolize edilebilir lizin ve metiyonin kaynakları yaz aylarında, ısı stresinin etkilerini azaltır.

Kullanım Şekli:

- Süt İneklerinde** : 20 - 50 gram/hayvan/gün.
Besi Sığırlarında : 10 - 25 gram/hayvan/gün.
Koyun ve Keçilerde : 10 - 25 gram/hayvan/gün.



I.C.O.N.
Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Reşit Galip Caddesi, Rabat Sokak 27/6 06700 GOP-Ankara – Türkiye
T: +90 (312) 436 48 88 • F: +90 (312) 436 18 88
www.iconagro.com

